

TABULAE PHYCOLOGICAE

oder

Abbildungen der Tange.

Herausgegeben

von

Friedrich Traugott Kützing,

Doctor der Philosophie und Professor der Naturwissenschaften
zu Nordhausen.

XII. Band.

Mit 100 Tafeln.

Nordhausen,

gedruckt auf Kosten des Verfassers.

1862.

TABULAE PHYCOLOGICAE

Abbildungen der Tange.

Illustrationen

Erstlich Franz von Süssmilch

11. Band

M. J. 1803

Hofbuchh.

Vertriebt bei Koster des Verlegers

1803.

V o r w o r t.

Der vorliegende zwölfte Band meiner *Tabulae phycologicae* enthält ausser dem Rest der Gattungen *Callithamnion* und *Phlebothamnion* noch die Arten der Gattungen *Stephanocomium*, *Leptothamnion*, *Seirospora*, *Griffithsia*, *Halurus*, *Pachychaete*, *Halodictyon*, *Hanowia*, *Ballia*, *Warrenia*, *Wrangelia*, *Spyridia*, *Bindera*, *Ptilota*, *Rhodocallis*, *Euptilota*, *Carpoblepharis*, *Haloplegma*, *Dictyurus*, *Thuretia*, *Dasyphila*, *Ptilocladia*; endlich von den *Ceramieen* die Gattungen *Hormoceras*, *Gongroceras*, *Trichoceras*, *Echinoceras*, *Celeceras* und *Acanthoceras*. Es bleiben demnach von der letzten Familie nur noch die Gattungen *Ceramium*, *Centroceras*, *Microcladia* und *Pteroceras* für den folgenden XIII. Band übrig.

Als ich vor 21 Jahren in der „*Linnaea*“ meine neuen Untersuchungen „über *Ceramium*“ bekannt machte, war man noch so sehr in den damaligen beschränkten Anschauungen befangen, dass die meisten Algologen wohl Zweifel über meine Darstellung gehegt haben mögen. Heute ist das anders geworden. Eine neue Generation ist entstanden, welche sich entweder schon mit meinen genauer begründeten Darstellungen bekannt gemacht hat, oder sich doch bemüht, dieselben näher kennen zu lernen. Der Mangel an guten Abbildungen hat

die specielle Kenntniss dieser Formen sehr erschwert; die in diesem Bande gegebenen Figuren helfen jetzt diesem Mangel ab und werden dazu beitragen das Studium dieser Algenformen ausserordentlich zu erleichtern. Dasselbe gilt auch von den Arten der oben erwähnten Gattungen der *Callithamnaceen*, namentlich von *Griffithsia*, *Spyridia*, *Ptilota*.

Und so möge denn auch dieser XII. Band der freundlichen Aufnahme des Publikums empfohlen sein.

Nordhausen, den 9. April 1862.

Kützing.

Bemerkungen zu den Tafeln des zwölften Bandes.

Tab. 1.

2894. *Callithamnion venustissimum*. (*Mont. in litt.* — *C. gracillimum* *Mont. in fl. Boliv.*) *C. alterne ramosum*, ramis elegantissime tripinnatis vel supradecompositis, pinnis pinnulisque alternis, laxioribus; articulis primariis elongatis, diametro 5plo longioribus, ceteris plerumque diametro sesquilateralibus. — Ad oras peruanas in mari pacifico. — Specimen dedit amic. Montagne.

Fig. a. Natürliche Grösse. — Fig. b. 100 mal vergrössert.

2895. *Callithamnion micropterum*. (*Mont. Sylloge plant. crypt. 448.*) *C. caespitosum roseum*, microscopicum; trichomatibus primariis repentibus, secundariis surrectis simplicibus non nisi apice pinnulatis. — In oris Canariensibus ad algas majores: Webb. — Speciminulum dedit cl. Montagne.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. 100 mal vergrössert.

Tab. 2.

2896. *Callithamnion nanum*. (*Kg. nov. sp.* — *C. versicolor* *Mont. fl. Boliv.*) *C. parvulum*, pallidum, ramis tripinnatis, pinnis pinnulisque superioribus approximatis confertis, adpresso-erectis, inferioribus distantibus patentibus, omnibus insigniter attenuatis; articulis primariis diametro triplo longioribus, secundariis subduplo longioribus, pinnularum diametro aequalibus. — In oceano pacifico ad oras Peruanas.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 100 mal vergrössert.

2897. *Callithamnion gorgoneum*. (*Mont. in litt.*) *C. decumbens*, vage ramosum, ramis primariis alternis vel

unilateralibus, elongatis, apice saepe incrassatis, ex ultimo articulo incrassato interdum plures ramulos flexuosos, inaequales emittentibus; articulis inferioribus cylindricis, diametro 3—5 plo longioribus. — In oceano atlantico ad oras Africae. Specimen dedit amic. Montagne.

Fig. c. d. 100 mal vergrößert.

Tab. 3.

2898. *Phlebothamnion tetragonum*. (Kg. Spec. Alg. 654.) — In mari germanico.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Hauptzweig mit Fieder und Vierlingsfrüchten 100 mal vergrößert.

2899. *Phlebothamnion brachiatum*. (*Ceramium brachiatum* Bonnem.) Praecedenti affine, habitu graciliori, articulis longioribus. — Ad oras belgicas.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. Nebenzweig mit Kapsel-
früchten 100 mal vergrößert.

Tab. 4.

2900. *Phlebothamnion stuposum*. (Kg. l. c. 655.) — Ad oras Capenses. Specimen dedit Suhr.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Einige Seitenzweige. b' ein Theil des filzigen Gewebes, welches den Hauptstamm der Alge umgibt, 40 mal vergrößert. — c. Eine kleine Fieder mit Vierlingsfrüchten, 100 mal vergrößert.

2901. *Phlebothamnion hirtum*. (Kg. Spec. Alg. 655. — *Callithamnion hirtum* Hook et Harv. Crypt. antarct. I. Tab. LXXVIII. Fig. II.) — Ad ins. Auckland.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. 40 mal vergrößert. — f. 100 mal vergrößert.

Tab. 5.

2902. *Phlebothamnion Montagnei*. (Kg. l. c. p. 655.) — Cap Hoorn.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Theil eines Hauptastes und eines Zweiges mit Kapselfrüchten, 100 mal vergrößert.

2903. *Phlebothamnion Gaudichaudii* (Ag. — Kg. l. c.) — Falklandsinseln.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. Hauptast mit einem Fiederzweig, 100 mal vergrössert.

Tab. 6.

2904. *Phlebothamnion Giraudyi*. (*Kg. l. c. 656.*)

— Ad oras gallicas.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Hauptast mit Fiederzweig 100 mal vergrössert.

2905. *Phlebothamnion scoparium*. (*Kg. l. c. 656.*)

— *Ballia scoparia* Harv. in litt. — *Callith. scoparium* Hook et Harv. *Crypt. antarct. II. Tab. CLXXXIX.*) — Ins. Falkland: Hooker.

Fig. c. d. Natürliche Grösse. — e. f. 100 mal vergrössert.

Tab. 7.

2906. *Phlebothamnion Arbuscula*. (*Lyngb. — Kg. l. c. 656.*) — Ad oras Britannicas.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Zweig mit Kapselfrüchten 100 mal vergrössert.

2907. *Phlebothamnion purpuriferum*. (*Kg. l. c. 656.*) — In sinu tabulari: Pappe!

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. Ast, e. Zweig mit einer kleinen Kapselfrucht, beide 100 mal vergrössert.

Tab. 8.

2908. *Phlebothamnion latissimum*. (*Kg. l. c. 656.*)

— Van-Diemens-Land: J. D. Hooker.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 100 mal vergrössert.

2909. *Phlebothamnion byssoides*. (*Kg. l. c. 657.*)

— Ad oras Angliae: Harvey.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. Hauptast und Fiederzweig mit Antheridien. — e. Fiederzweig mit Vierlingsfrüchten; beide 100 mal vergrössert.

Tab. 9.

2910. *Phlebothamnion corymbiferum*. (*Kg. Spec.*)

Alg. 657.) — In mari adriatico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Fiederzweig mit Kapsel-
früchten in Verbindung mit dem Hauptast 100mal vergrössert.

2911. *Phlebothamnion corymbosum*. (*Kg. l. c.*)
— In mari baltico.

Fig. *c*. Natürliche Grösse. — *d*. Zweig mit Kapselfruch-
ten, 100mal vergrössert.

Tab. 10.

2912. *Phlebothamnion versicolor*. (*Kg. l. c. 657.*)
— In mari adriatico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Zweig mit Kapselfruch-
ten; *c*. Zweig mit Vierlingsfrüchten; *d*. Stück des Haupt-
stammes mit den Rindenfasern — 100mal vergrössert.

2913. *Phlebothamnion lanceolatum*. (*Derbes in
litt.*) Ph. pollicare, tenellum, trichomatibus alterne ramosis,
ramis elongatis alterne pinnatis, pinnis ambitu lanceolatis,
gracillimis, supradecompositis; articulis omnibus elongatis,
diametro 4—6plo longioribus. — Massilia.

Fig. *e*. Natürliche Grösse. — *f*. Basisstück, *g*. Fieder-
zweig mit Vierlingsfrüchten — 100mal vergrössert.

Tab. 11.

2914. *Phlebothamnion spinescens*. (*Kg. l. c. 658.*)
— In mari germanico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Zweig mit Vierlings-
früchten, 40mal vergrössert.

2915. *Phlebothamnion granulatum*. (*Kg. l. c.*) —
In mari adriatico.

Fig. *c*. Natürliche Grösse. — *d*. Fruchttragende Endzweige,
e. Theil vom Hauptstamme, 100mal vergrössert.

Tab. 12.

2916. *Phlebothamnion graniferum*. (*Menegh. —
Kg. Spec. Alg. 657.*) — Marseille.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Hauptstamm mit Zweig
und Vierlingsfrüchten, 100mal vergrössert.

2917. *Phlebothamnion ellipticum*. (*Kg. l. c. 658.*)
— *Mont. Canar. 177.*) — Ad. ins. Canarias: Montagne!

Fig. *c*. Natürliche Grösse. — *d*. 100mal vergrössert.

Tab. 13.

2918. *Phlebothamnion grande*. (*Kg. l. c. 658.*) —
In mari mediterraneo.

Fig. *a.* Natürliche Grösse — *b.* Zweig mit Vierlings-
früchten. — *c.* Zweig mit Kapselfrüchten. — *d.* berindeter
Ast mit Zweigen — 100mal vergrössert.

2919. *Phlebothamnion spongiosum*. (*Kg. l. c.*
658.) — Cherbourg.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* Zweig mit Vierlings-
früchten. — *g.* Stück vom Hauptast — 100mal vergrössert.

Tab. 14.

2920. *Phlebothamnion pachycaulon*. (*Kg. l. c.*
658.) — Biarritz.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Stamm mit Zweigen. —
c. Zweig mit Kapselfrüchten — 100mal vergrössert.

2921. *Phlebothamnion velutinum*. (*Kg. l. c. 659.*) —
Nova Hollandia.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e. f.* Verschiedene Zweige. —
g. Stammstück — 100mal vergrössert.

Tab. 15.

2922. *Phlebothamnion squarrosum*. (*Kg. l. c.*
659.) — Ad Caput bonae spei.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Rindengewebe des Stam-
mes. — *c.* Verschiedene Zweige mit Kapselfrüchten — 100mal
vergrössert.

2923. *Callithamnion pinnato-furcatum*. (*Kg.*
nov. sp.) *C. parvum, delicatulum, alterne ramosum, ramis*
alterne tripinnatis virgatis; articulis primariis diametro parum
longioribus, ramulorum 3–6 plo longioribus cylindricis. —
In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Untertheil, — *f.* Ober-
theil — 100mal vergrössert.

Tab. 16.

2924. *Stephanocomium adriaticum*. (*spec. nov.*)
Trichomate simplici erecto, articulis inferioribus cylindricis,

diametro 3—4plo longioribus, superioribus clavatis, diametro 4—6plo longioribus, summis ex apice rammelliferis; ramellis verticillatis numerosis gracilibus delicatulis basi stipitatis, stipite demum elongato, apice ramos plures divisos, in pilum longissimum tenerrimum attenuatos emittente. — In mari adriatico et ionico.

Fig. *a.* Ein Obertheil, — *b.* ein Untertheil, — *c.* die äusserste Spitze mit den Anfängen des Ramellenkranzes — 100mal vergrössert. — *d.* Ein ausgewachsener Ramell, — *e.* ein jüngerer Ramell — beide 300mal vergrössert.

2925. *Leptothamnion Rabenhorstii*. (*Kg. Spec. Alg.* 896.) — In mari ionico.

Fig. *f.* Natürliche Grösse. — *g.* Ein Ast mit Kapsel Früchten 100mal vergrössert.

Tab. 17.

2926. *Seirospora Griffithsiana* (*Harv. Phycol. brit. Pl.* 21. — *Phlebothamnion seirospermum. Kg. Spec. Alg.* 657.) — In mari britannico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c.* Zweigspitzen mit den kettenförmigen Vierlingsfrüchten. — *d.* Ein Theil des berindeten Stammes — 100mal vergrössert.

2927. *Seirospora flaccida*. (*Kg. l. c.* 896.) — In mari ionico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* 100mal vergrössert.

Tab. 18.

2928. *Seirospora humilis*. (*Kg. l. c.* 897.) — In mari ionico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück mit Vierlingsfrüchten, — *c.* Basisstück mit sehr abstehenden Zweigen — 100mal vergrössert.

2929. *Griffithsia Argus*. (*Mont. Canar. p.* 176. *Pl. VIII. Fig.* 4. — *Kg. l. c.* 662.) — Ad Canarias. Specimenulum dedit amic. Montagne.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Theil des Hauptstammchens mit den quirlförmigen, grösstentheils abgekürzten Fruchtzweigen mit Vierlingsfrüchten. — *f. g.* Andere Seitenzweige aus der untern Stammregion — 100mal vergrössert.

Tab. 19.

2930. *Griffithsia grandis*. (*Kg. nov. sp.*) Gr. stipe brevi simplici, ex cellula unica elongata formato, basi attenuato et in radículas diviso, trichomate dichotomo ramossissimo, articulis maximis subgloboso-obovatis, isthmo tenui conjunctis. — Ad oras Novae Hollandiae.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Ein Glied in seiner Verbindung mit den andern Gliedern, schwach vergrössert.

2931. *Griffithsia tasmannica*. (*Gr. corallina* β . *tasmannica* *Kg. Spec. Alg.* 659.) — Van Diemens-Land.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. e. schwach vergrössert.

Tab. 20.

2932. *Griffithsia Corallina*. (*Ag.* — *Kg. l. c.* 659.) — Ad oras Britanniae.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Ein Gelenk mit Vierlingsfrüchten, — c. mehrere Endglieder, mit den vorigen 40mal vergrössert. — d. e. f. Vierlingsfrüchte 100mal vergrössert.

2933. *Griffithsia setacea*. (*Ag.* — *Kg. l. c.* 660.) — Ad oras Britanniae.

Fig. g. Natürliche Grösse. — h. Eine sterile Fadenspitze, — i. ein Fruchtzweig mit Vierlingsfrüchten — 40mal vergrössert; k. ein Involucralblatt mit Vierlingsfrüchten 100mal vergrössert.

Tab. 21.

2934. *Griffithsia crinita*. (*Kg. nov. sp.*) Gr. trichomatibus capillaribus elongatis dichotomis, gracilibus; articulis elongatis apice incrassatis, diametro plerumque 8plo longioribus, ultimis brevioribus, geniculis parum contractis. — Nova Hollandia.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. c. 40mal vergrössert.

2935. *Griffithsia chilensis*. (*Mont. Sylloge crypt.* 446. — *Kg. Spec. Alg.* 660.) — Ad oras Chilenses.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. Gipfelstück. — f. Basisstück — 40mal vergrössert.

Tab. 22.

2936. *Griffithsia secundiflora*. (*J. Ag.* — *Kg. Spec. Alg.* 660.) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* 40mal vergrössert.

2937. *Griffithsia cymiflora*. (*Kg. nov. sp.*). Habitu et magnitudine praecedentis, ramis terminalibus brevioribus incurvis, carpocloniis lateralibus solitariis subsessilibus; involucro globoso dichotomo. — Massilia.

Fig. *c.* Natürliche Grösse. — *d.* Eine Spitze 40mal vergrössert.

Tab. 23.

2938. *Griffithsia antarctica*. (*Hook. et Harv. Cr. antarct.* 182. — *Kg. Spec. Alg.* 660.) — Falkland: J. D. Hooker.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, 40mal vergrössert.

2939. *Griffithsia subverticillata*. (*Kg. nov. sp.*) *Gr. setacca*, di-trichotoma, irregularis; articulis fere cylindricis, elongatis, obsoletis; ramellis fructiferis rarioribus lateralibus divisis, basi breviter articulatis, articulo terminali interdum valde elongato. — Ad oras Hiberniae.

Fig. *c.* Natürliche Grösse, — *d.* 40mal vergrössert.

Tab. 24.

2940. *Griffithsia barbata*. (*Kg. Spec. Alg.* 660. — *Gr. pogonoides Menegh.*) — Ad oras Britanniae.

Fig. *a.* Exemplar mit Kapselfrüchten in natürlicher Grösse. — *b.* Ein Unterstück, — *c.* ein Mittelstück mit Kapselfrüchten, — *d.* zwei Kapselfrüchte isolirt, — *e.* Gipfeltheil, mit den vorigen 40mal vergrössert. — *f.* Exemplar mit Vierlingsfrüchten in natürlicher Grösse. — *g.* Gipfeltheil, 40mal vergrössert. — *h.* Gipfeltheil mit Vierlingsfrüchten 100mal vergrössert.

Tab. 25.

2941. *Griffithsia Binderiana*. (*Sonder. pl. Preiss.* — *Kg. l. c.*) — Nova Hollandia.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Fruchtzweig mit Vierlingsfrüchten, — c. isolirtes Bündel mit Vierlingsfrüchten, 80mal vergrössert.

2942. *Griffithsia irregularis*. (Ag. — Kg. l. c. 660.) — In mari adriatico.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. f. 40mal vergrössert.

Tab. 26.

2943. *Griffithsia sphaerica*. (Schousboe. — Kg. l. c. 660.) — Massilia.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Gipfelstück, — c. Mittelstück, — d. Fruchtzweig mit Vierlingsfrüchten, 40mal vergrössert. — e. Vierlingsfrucht, 100mal vergrössert.

2944. *Griffithsia devoniensis*. (Harv. Phyc. br. Pl. 16. — Kg. l. c. 661.) — Ad oras Angliae.

Fig. f. Natürliche Grösse. — g. h. 40mal vergrössert. — i. Vierlingsfrüchte, 100mal vergrössert.

Tab. 27.

2945. *Griffithsia opuntioides*. (J. Ag. — Kg. Spec. Alg. 661.) — In mari mediterraneo.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Endglieder 40mal vergrössert.

2946. *Griffithsia Schousboei*. (Mont. — Kg. l. c.) — Ad oras Dalmatiae.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. Endzellen mit Vierlingsfrüchten, 40mal vergrössert. — e. Vierlingsfrüchte 100mal vergrössert.

Tab. 28.

2947. *Griffithsia neapolitana*. (Naegeli in litt.) Gr. cespite pulvinato, trichomatibus setaceis, fastigato-dichotomis, apice acutiusculis; articulis inferioribus elongatis subclavatis, superioribus obovatis, supremo globoso minuto. — In sinu Neapolitano: Naegeli.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. c. 40mal vergrössert.

2948. *Griffithsia dalmatica*. (Kg. nov. sp.) Gr. cespite pulvinato, trichomatibus setaceis, alterne ramosis, ra-

mis virgatis, ramulis minoribus acutis; articulis inferioribus cylindricis, superioribus oblongo-ellipticis, supremo conico minuto. — Ad oras Dalmatiae.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. f. 40 mal vergrössert.

Tab. 29.

2949. *Griffithsia phyllamphora*. (*J. Ag. — Kg. Spec. Alg. 661.*) — In mari mediterraneo. (Praecedentibus tenuior.)

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Obertheil mit Vierlingsfrüchten 40 mal vergrössert. — c. Vierlingsfrüchte 100 mal vergrössert.

2950. *Griffithsia ligustica*. (*Kg. nov. sp.*) Gr. ultra setacea, pulvinata, basi dichotoma, deinde trichotoma, ramis elongatis subsimplicibus in apicem leviter dilatatis; articulis cylindricis diametro 4—5 plo longioribus. — In mari ligustico.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. f. 40 mal vergrössert.

Tab. 30.

2951. *Griffithsia globulifera*. (*Harv. in litt.*) Gr. capillaris, dichotoma ramosissima; articulis gracilibus elongatis clavatis, terminalibus inflatis, globoso-obovatis. — New-York: Bailey.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. c. Gipfelstücke, — d. Basisstück — 40 mal vergrössert.

2952. *Griffithsia furcellata*. (*J. Ag. — Kg. Spec. Alg. 661.*) — Amalfi: J. Agardh. Specimen dedit cl. Binder.

Fig. e. Natürliche Grösse. — f. g. 40 mal vergrössert.

Tab. 31.

2953. *Griffithsia ramellosa*. (*Kg. nov. sp.*) Gr. capillaris, in apicem sensim attenuata, vage ramosa, ramellis numerosis unilateralibus brevibus simplicibus acutissimis; articulis cylindricis, primariis diametro 5—6 plo longioribus, ramellorum sensim brevioribus. — In sinu neapolitano.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 40 mal vergrössert.

2954. *Griffithsia tenuis*. (*Ag. — Kg. Spec. Alg. 661.*) — Venetiis.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. 40 mal vergrössert.

Tab. 32.

2955. *Griffithsia arachnoidea*. (*Ag.* — *Kg. l. c.* 662.) — Ad insulas fortunatas.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. c. 40mal vergrössert.

2956. *Griffithsia Duriaei*. (*Mont. fl. Alger. 143.* — *Sylloge crypt. 447.*) „Fronde cespitosa unciali, tenui, roseo-coccinea, dichotoma fastigata, apicibus inaequaliter furcellatis acutis, segmentis patenti-erectis; articulis cylindraceis diametro 2—4plo longioribus, geniculis haud constrictis.“ — In gelidio corneo ad oras Africae: Durieu. Amic. Montagne specim. dedit.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. 40mal vergrössert.

Tab. 33.

2957. *Griffithsia radicans*. (*Kg. nov. sp.*) Gr. parvula, parasitica, repens, trichomatibus setaceis irregulariter ramosis, ubique fere aequicrassis, articulis cylindraceis diametro plerumque triplo longioribus, ultimis obtusissimis. — Ad oras Brasiliae in algis majoribus.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. c. 40mal vergrössert.

2958. *Griffithsia repens*. (*Zanardini.* — *Kg. Spec. Alg. 662.*) — Dalmatia.

Fig. d. Natürliche Grösse. — e. 40mal vergrössert. — f. 100mal vergrössert.

Tab. 34.

2959. *Halurus simplicifilum*. (*Decand.* — *Kg. l. c. 663.*) — Ad oras Angliae.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 40mal vergrössert. — c. Ein einzelner Gliederfaden aus dem Quirl mit einem unbekannten Schmarotzerpflänzchen bei d., 40mal vergrössert.

2960. *Halurus equisetifolius*. (*Kg. l. c. 662.*) — Ad oras atlanticas Galliae.

Fig. e. Natürliche Grösse. — f. Ein Fruchtweig, 10mal vergrössert. — g. Involucralblatt mit Vierlingsfrüchten. — h. i. Quirlzweige — 40mal vergrössert.

Tab. 35.

2961. *Pachychaeta griffithsioides*. (*Kg. nov. gen.*) Phycoma filiforme articulatum repens parenchymaticum, emit-

tens ramos erectos subdichotomos brevissime articulatos; articuli ex cellula tenui axillari et cellulis (8—9) pericentralibus magnis, annulatim circumpositis. Cystocarpia in ramellis lateralibus subcymosis, globosa, periangio clauso parenchymatico, ex cellularum strato unico formato; spermatiis ex basi radiatim dispositis, paranematibus obsoletis delicatissimis intermixtis. — Alga griffithsiaeformis, ultra setacea, brevissime articulata, siccitate rugulosa. (*Griffithsia brachyarthra* Kg. in *Hohenackers Meeralgen*. No. 437.) — Ad Antillas.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Fruchtzweig mit Kapselfrucht nebst c. Hauptstamm. — d. Stamm, quer durchschnitten. — e. Kapselfrucht, in der Richtung der Längenaxe durchschnitten. Sämmtlich 40mal vergrössert.

Tab. 36.

2962. *Halodictyon mirabile*. (*Zanardini*. — Kg. *Spec. Alg.* 662.) — In mari adriatico: Meneghini.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 40mal vergrössert.

2963. *Hanowia australis*. (*Sonder*. — Kg. l. c. 662.) — Ad Novam Hollandiam: Preiss. Specimen dedit cl. Sonder.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. 40mal vergrössert.

Tab. 37.

2964. *Ballia Callitricha*. (*Mont*. — Kg. *Spec. Alg.* 663.) — Falkland: J. D. Hooker.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Astende, 100mal vergrössert. — c. Theil einer Fieder mit Vierlingsfrüchten an besonders gekrümmten Fruchstäben. — d. Ein stärkerer Ast mit der Rindenschicht, welche nach aussen zu einem filzigen Gewebe auswächst; — e. Querschnitt durch denselben — wie die vorigen Figuren 100mal vergrössert.

Tab. 38.

2965. *Ballia Hombronii*. (*Mont*. in *D'Urv. Voy. au Pol sud*. Pl. 12. Fig. 1. a. — Kg. l. c.) — Cap Horn: D'Urville. Speciminulum dedit amic. Montagne.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 100mal vergrössert.

2966. *Ballia Priourii*. (*Kg. Spec. Alg.* 664.) — Cayenne.

Fig. c. c. Natürliche Grösse, — d. e. f. 100mal vergrössert.

Tab. 39.

2967. *Warrenia comosa*. (Harv. — *Phlebothamnion comosum*. Kg. Bot. Zeitg. 1847.) W. trichomate ultra setacea, alterne ramoso, solido, corticato, ramis virgatis longitudinaliter obsessis ramellis fasciculatis fructiferis tenerrimis flagelliformibus, articulis cylindricis, diametro 2—3 plo longioribus; tetrachocarpiis lateralibus, breviter pedicellatis. — Nova Hollandia: Harvey,

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. 100 mal vergrössert.

2968. *Wrangelia verticillata*. (Kg. Spec. Alg. 664.) In mari adriatico.

Fig. c. Natürliche Grösse. — d. unberindeter Frucht-
Fruchtweig mit Vierlingsfrüchten. — e. Hauptast mit seiner Rindenbekleidung. Beide Figuren 100 mal vergrössert.

Tab. 40.

2969. *Wrangelia penicillata*. (Ag. — Kg. l. c. 664.) — In mari adriatico.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Fruchtweig mit Antheridien. — c. Stück eines berindeten Hauptastes — beide 100 mal vergrössert. —

Fig. d. var. *tenera* (*Wrangelia tenera* Ag.) in natürlicher Grösse. — e. Fruchtweig mit Vierlingsfrüchten. — f. Stammtheil, — wie der vorige 100 mal vergrössert.

Tab. 41.

2970. *Wrangelia comosa*. (Harv. — Kg. l. c. 664. excl. Synon.) — Van Diemens Land: J. D. Hooker.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Fruchtweig mit Vierlingsfrüchten. — c. Oberer Stammtheil. — d. Unterer Stammtheil, sämmtlich 100 mal vergrössert.

2971. *Wrangelia dasyclada*. (Harv. — Kg. l. c. 664.) — Tasmania.

Fig. e. Natürliche Grösse. — f. Berindeter Stammtheil mit g. einem unberindeten haarförmigen Seitenzweige. — h. Aus der Spitze eines Astes mit Vierlingsfrüchten. Sämmtlich 100 mal vergrössert.

Tab. 50.

2987. *Spyridia Berkeleyana*. (*Mont. Kg. spec. Alg.* 667.) — Ad oras Algeriae: Montagne!

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. 100mal vergrössert.

2988. *Spyridia armata*. (*Kg. l. c.* 668.) — Ad oras Senegambiae.

Fig. *c*. Natürliche Grösse. — *d*. 100mal vergrössert.

Tab. 51.

2989. *Spyridia aculeata*. (*Kg. l. c.* 668.) — In oceano atlantico tropico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. 100mal vergrössert.

2990. *Spyridia spinella*. (*Sonder. — Kg. l. c.* 668.) Ad novam Hollandiam.

Fig. *c*. Natürliche Grösse. — *d*. 100mal vergrössert.

Tab. 52.

2991. *Spyridia ericoides*. (*Kg. l. c.* 668.) — E mari indico prope Madras: Dr. Wight!

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. 100mal vergrössert.

2992. *Spyridia tetracantha*. (*Kg. nov. sp.*) Sp. caule crassiusculo, fruticoso; ciliis ramiformibus crassis, apice tetracanthis. — Caput bonae spei: Drege.

Fig. *d*. Natürliche Grösse. — *e*. 100mal vergrössert.

Tab. 53.

2993. *Bindera cupressina*. *Harv.* — *Spyridia cupressina* *Kg. Spec. Alg.* 668). — Ad caput bonae spei: Harvey!

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Theil eines obern Zweiges mit vierzeiligen dornartigen Blättern, durch die Loupe vergrössert. — *c*. Dornartiges Blatt, welches an der Basis den verästelten Fruchtzweig (*d*) mit Vierlingsfrüchten trägt. — *e*. Längsschnitt durch den obern Theil des Stammes, — *f*. Querschnitt durch den Stamm. *c* — *f* 100mal vergrössert.

Tab. 54.

2994. *Ptilota plumosa*. (*Ag.* — *Kg Sp. Alg* 669.) — Helgoland.

Fig. *a*. Exemplar mit Vierlingsfrüchten in natürlicher Grösse. — *b*. Fiederchen mit Vierlingsfrüchten — *c*. Fiederchen mit Kapselfrüchten. — *d* Einzelne Kapselfrucht — wie die vorigen 100 mal vergrössert.

2995. *Ptilota plumosa* β . *pectinata*; *pinnis pectinato-pinnulatis*, *pinnulis lanceolato-linearibus utrinque attenuatis elongatis*, *plerumque integerrimis*. — *Ad oras Scotiae*.

Tab. 55.

2996. *Ptilota plumosa* var. *formosa*. (*Kg. l. c.* 669.) — Helgoland.

Fig. *a*. Eine Fieder mit Vierlingsfrüchten schwach vergrössert. — *b. c. d*. Einzelne Fiederchen mit Vierlingsfrüchten, 100 mal vergrössert.

2997. *Ptilota plumosa* var. *serrata*. (*Pt. serrata Kg. l. c.* 670.) — Helgoland.

Fig. *e*. Fiedertheil mit beiderseits scharf gesägten Fiederchen, — *f*. Fiederspitze mit an der Aussenseite gesägten Fiederchen.

Tab. 56.

2998. *Ptilota elegans*. (*Kg. l. c.* 670.) — *Ad oras Angliae*.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b. c*. Zwei Fiedern, 100 mal vergrössert.

2999. *Ptilota articulata*. (*J. Ag.* — *Kg. l. c.* 670.) — *Nova Hollandia*.

Fig. *d*. Natürliche Grösse. — *e*. Eine Fieder 100 mal vergrössert.

Tab. 57.

3000. *Rhodocallis elegans*. (*Kg. l. c.* 670.) — *Nova Hollandia*.

Fig. *a*. Fragment in natürlicher Grösse. — *b*. Fieder mit Kapselfrüchten am Ende, schwach vergrössert. — *c*. Zweilappige Kapselfrucht, 100 mal vergrössert. — *d*. Querschnitt durch den untern Theil des Jugaments, 100 mal vergrössert.

3001. *Rhodocallis setigera*. (*Kg. l. c. 670.*) — Caput bonae spei: Harvey.

Fig. *e*. Natürliche Grösse. — *f*. Fiederspitze, — *g*. unterer Fiedertheil, — *h*. Querschnitt durch das untere Jugament. *f—h*. 100 mal vergrössert

Tab. 58.

3002. *Rhodocallis asplenoides*. (*Kg. l. c. 671.* — *Ptilota aspl. Ag.*) — Kamtschatka.

Fig. *a*. Foliis argute serratis, capitulis fructiferis pedicellatis. Natürliche Grösse. — *b*. Ein Blatt mit Vierlingsfrüchten, 40 mal vergrössert. — *c*. Ein Köpfchen mit Vierlingsfrüchten, — *d*. Fiederchen mit vereinzelt Vierlingsfrüchten, — beide 100 mal vergrössert.

Fig. *e*. Foliis integerrimis, capitulis fructiferis sessilibus. — Natürliche Grösse.

Fig. *f*. Exemplar mit Kapselfrüchten in natürlicher Grösse. — *g*. Fieder mit zwei Kapselfrüchten, 40 mal vergrössert. — *h*. Involucrum mit Kapselfrucht, — *i*. Querschnitt durch das untere Jugament — wie das vorige 100 mal vergrössert.

Tab. 59.

3003. *Euptilota formosissima*. (*Kg. Spec. Alg. 671.* — *Ptilota formosissima Mont.*) — Auckland.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Theil eines Längenschnitts durch das Jugament bis zur Axe. — *c*. Querschnitt durch das Jugament. — *d*. Kapselfrucht mit einem Hüllblatte (*e*). — *f*. Fiederchen mit Vierlingsfrüchten. *b—f*. 100 mal vergrössert.

3004. *Euptilota Harveyi*. (*Kg. l. c. 671.*) — Falkland: J. D. Hooker.

Fig. *g*. Fragment in natürlicher Grösse. — *h*. Fiederchen mit Vierlingsfrüchten. — *i*. Kapselfrucht mit Hüllblatt. — *k*. Fiederspitze. — *h—k*. 100 mal vergrössert.

Tab. 60.

3005. *Euptilota Pappeana*. (*Kg. l. c. 671.*) — Caput bonae spei: Pappe.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Fiederspitze, — *c*. Querschnitt vom Jugament. Beide 100 mal vergrössert.

3006. *Carpoblepharis pinnatifolia*. (*Kg. l. c. 691.*)
 — Caput bonae spei.
 Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Fieder mit Vierlingsfrüchten 100mal vergrössert.

Tab. 61.

3007. *Carpoblepharis flaccida*. (*Kg. l. c. 690.*)
 — Caput bonae spei.
 Fig. *a.* Exemplar mit Vierlingsfrüchten in natürlicher Grösse. — *b.* Fiederchen mit Vierlingsfrüchten. *c.* Querschnitt durch dasselbe. — *d.* Einzelne Vierlingsfrüchte. — *e.* Querschnitt durch den Stamm. — *b-e.* 100mal vergrössert.
 Fig. *f.* Exemplar mit Kapselfrüchten in natürlicher Grösse. — *g.* Fiederchen mit Kapselfrucht und Involucrum. — *h.* Kapselfrucht isolirt. Beide 100mal vergrössert.

Tab. 62.

3008. *Haloplegma Duperreyi*. — (*Mont. Nouv. Annal. des sc. nat. XVIII. Pl. 7. Fig. 1.* — (*Kg. Spec. Alg. 672.*) — Martinique: Duperrey. Specim. dedit amic. Montagne.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Fadengewebe. — *c.* Gewebe der Aussenfläche, 100mal vergrössert.

3009. *Haloplegma Preissii*. (*Sonder pl. Preiss.* — *Kg. l. c. 672.*) — Nova Hollandia: Preiss.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Inneres Fadengewebe mit Vierlingsfrüchten an den Aussenfäden, 100mal vergrössert.

Tab. 63.

3010. *Haloplegma Cornu Damae*. (*nov. sp.*) *H. stipite ramoso sursum complanato, phyllomate irregulariter bi-tripinnato, apicem versus dilatato, laciniato.* — Nova Hollandia.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Aussengewebe, *c.* Innengewebe, beide 100mal vergrössert.

3011. *Haloplegma africanum*. (*Kg. Spec. Alg. 672.*) — Ad oras Africae australioris.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e. f.* Aeusseres und inneres Zellgewebe 100mal vergrössert.

Tab. 64.

3012. *Dictyurus occidentalis*. (*J. Ag. Kg. l. c. 673.*) — *Ad oras mexicanas: Liebmann.*

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Theil der Mittelrippe, *c.* Zweig, welcher sich zu dem Fadennetz ausbreitet. — *d.* Querschnitt durch das Stämmchen, — wie die vorigen 100mal vergrössert.

3013. *Thuretia quercifolia*. (*Decne. — Kg. l. c. 673.*) — *Nova Hollandia.*

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* Querschnitt vom Stiel. — *g.* Gewebe der Lamina. Beide 100mal vergrössert.

Tab. 65.

3014. *Dasyphila Preissii*. (*Sonder, pl. Preiss. — Kg. l. c. 673.*) — *Nova Hollandia.*

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Querschnitt durch eine Fieder, 100mal vergrössert.

3015. *Ptilocladia pulchra*. (*Sonder l. c. — Kg. l. c. 674.*) — *Nova Hollandia.*

Fig. *c.* Natürliche Grösse. — *d.* Seitenansicht eines Präparats, welches grösstentheils der quirlförmigen Fadenzweige beraubt ist, die die äussere Schicht des Körpers bilden. — *e.* Querschnitt, wie vorige Figur 100mal vergrössert.

Tab. 66.

3016. *Hormoceras polyceras*. (*Kg. l. c. 674.*) — *In mari adriatico.*

Fig. *a.* Exemplar mit Vierlingsfrüchten. — *b.* Exemplar mit Kapselfrüchten, beide in natürlicher Grösse. — *c. d.* Vierlingsfrüchte. — *e.* Kapselfrucht, — 100mal vergrössert.

3017. *Hormoceras polyceras* β . *proliferum* — *Tergesti.*

Fig. *f.* Natürliche Grösse eines kapseltragenden Exemplars. — *g.* Kapselfrüchte, 40mal vergrössert.

Tab. 67.

3018. *Hormoceras nodosum*. (*Kg. l. c. 674.*) — *In mari ligustico.*

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* 40mal vergrössert.

3019. *Hormoceras polygonum*. (*Kg. nov. Sp.*) *H. un-*
ciale, capillaceum, moniliforme, exacte dichotomum, apicibus
acutis, leviter hamatis; zonis omnibus distantibus, superiori-
bus vix prominentibus, inferioribus tumidis; articulis diametro
sesquolongioribus, raro aequalibus. — Tergesti.

Fig. c. Natürliche Grösse — d. e. 100mal vergrössert.

Anmerk g. Vergl. Tab. 100. a. b. in diesem Bande!

Tab. 68.

3020. *Hormoceras diaphanum*. (*Kg. l. c. 675.*) —
In mari adriatico.

Fig. a. Natürliche Grösse. — b. Untertheil, — c. Mittel-
theil, — d. Fruchtzweig mit Vierlingsfrüchten, — e. f. Gipfel-
stück — sämmtlich 40mal vergrössert.

3021. *Hormoceras gracillimum*. (*Kg. l. c. 675.*) —
In mari adriatico.

Fig. g. Natürliche Grösse. — h. Basisstück, — i. Mittel-
stück mit Vierlingsfrüchten, k. Gipfelstück, — sämmtlich
40mal vergrössert.

Tab. 69.

3022. *Hormoceras flaccidum*. (*Harv. in litt.*) *H. mi-*
nutulum, delicatulum, gelatinosum; forcipibus tenuissimis clau-
sis; zonis inferioribus parum elevatis; articulis inferioribus
diametro 6 — 7 plo, mediis 3 plo longioribus, superioribus ae-
qualibus, interstitiis maxime hyalinis. — Ad oras britannicas
prope Kilkee: Harvey.

Fig. a. Natürliche Grösse; — b. d. Untertheile, — c. Gi-
pfelstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

3023. *Hormoceras moniliforme*. (*Kg. l. c. 675.*) —
In mari adriatico.

Fig. e. Exemplar mit Kapselfrucht in natürlicher Grösse.
— f. Gipfelstück, g. Basisstück, beide 40mal vergrössert.

Fig. h. Exemplar mit Vierlingsfrüchten in natürlicher
Grösse, — i. fruchtragendes Mittelstück, 40mal vergrössert.

Tab. 70.

3024. *Hormoceras circinatum*. (*Kg. l. c. 675.*) —
In mari mediterraneo.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, — *c.* Mittelstück, — *d.* Basisstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

3025. *Hormoceras Catenula.* (*Kg. l. c. 675.*) — In mari mediterraneo.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* Gipfelstück mit Kapselfrüchten, — *g.* Basisstück, beide 40mal vergrössert.

Tab. 71.

3026. *Hormoceras decurrens.* (*Kg. l. c. 675.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Basisstück, — *c.* Mittelstück, *d.* Gipfelstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

3027. *Hormoceras cateniforme.* (*Kg. l. c. 675.*) — Ad oras Angliae.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f. g.* Mittelstück mit Vierlingsfrüchten in den Seitenzweigen; 40mal vergrössert.

Tab 72.

3028. *Hormoceras duriusculum.* (*Kg. l. c. 675.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Basisstück, — *c.* Mittelstück, — *d.* Gipfelstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

3029. *Hormoceras confluens.* (*Kg. l. c. 675.*) — In mari adriatico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* Gipfelstück, — *g.* Mittelstück, — *h.* Basisstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

Tab. 73.

3030. *Hormoceras perversum.* (*Kg. Spec. Alg. 676.*) — In mari septentrionali.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, — *c.* Mittelstück, — *d.* Basisstück, sämmtlich 40mal vergrössert.

3031. *Hormoceras fruticulosum.* (*Kg. l. c. 676.*) — In mari germanico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f. g.* Mittel- und Basisstücke mit Vierlingsfrüchten, 40mal vergrössert.

Tab. 74.

3032. *Hormoceras Biasolettianum*. (*Kg. l. c. 676.*)
— In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, — *c.* oberes Mittelstück, — *d.* unteres Mittelstück, — *e.* Basisstück. Sämmtlich 40mal vergrössert

3033. *Hormoceras variegatum*. (*Kg. l. c. 676.*) —
Ad oras Americae australis.

Fig. *f.* Natürliche Grösse. — *g.* Gipfelstück mit Vierlingsfrüchten, — *h.* Mittelstück mit Vierlingsfrüchten, beide 40mal vergrössert.

Tab. 75.

3034. *Hormoceras pygmaeum*. (*Kg. l. c. 676.*) —
Civita vecchia.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Exemplar mit Kapsel-
früchten, — *c.* steriles Exemplar — beide 40mal vergrössert.

3035. *Hormoceras pulchellum*. (*Kg. l. c. 676.*) —
In sinu tabulari.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Gipfelstück, — *f.* Mittel-
stück, — beide 40mal vergrössert. — *g.* Zone vom Stamm-
chen, — *h. i.* zwei äusserste Spitzen, alle drei 100mal ver-
grössert.

Tab 76.

3036. *Hormoceras siliquosum*. (*Kg. l. c. 676.*) —
Torbay: Berkeley.

Fig. *a.* Natürliche Grösse — *b.* Gipfelstück, — *c.* Mit-
telstück, beide mit Vierlingsfrüchten und 40mal vergrössert.

3037. *Hormoceras syntrophum*. (*Kg. l. c. 676.*) —
H. digitale et ultra, setaceum, zonis undulatis parum decur-
rentibus, leviter laciniatis, inferioribus distantibus, supremis
approximatis contiguis; apicibus circinatis, haut forcipatis;
articulis primariis diametro 3 — 4plo longioribus, superiori-
bus diametro subaequalibus, vel brevioribus. — In mari
adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* 40mal vergrössert.

Tab. 77.

3038. *Gongroceras Deslongchampii*. (*Kg. Spec. Alg.* 677.). — Ad oras Galliae.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Gipfelstück, *c*. Mittelstück, beide mit Vierlingsfrüchten; — *d*. Basisstück. — *b*. — *d*. 40 mal vergrössert

3039. *Gongroceras Agardhianum*. (*Ceramium Agardhianum Griff.*) varietas monstruosa praecedentis, tetrachocarpiis conglomeratis. — Torquay: Berkeley.

Fig. *e*. Natürliche Grösse. — *f, g*. 40 mal vergrössert

Tab. 78.

3040. *Gongroceras pellucidum*. — (*Kg. l. c.* 678. — *Ceramium rigidulum et nodosum Harv. Phycol. brit. Pl. XC.*) — In mari adriatico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b* Gipfelstück mit Kapsel-
früchten, — *c*. Mittelstück mit Vierlingsfrüchten, beide 40-
mal vergrössert.

3041. *Gongroceras strictum*. — (*Kg. l. c.* 678.) — Helgoland: Binder.

Fig. *d*. Natürliche Grösse. — *e*. Mittelstück mit zahlrei-
chen Vierlingsfrüchten, 40mal vergrössert.

Tab. 79.

3042. *Gongroceras fastigatum*. (*Harv. — Kg. l. c.* 678.) — Ad oras Angliae: Harvey.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Basisstück, — *c*. Gipfel-
stück mit Vierlingsfrüchten, beide 40 mal vergrössert.

3043. *Gongroceras nodiferum*. (*Kg. l. c.* 678. *excl. synon.*) — Lessina in mari adriatico: Botteri.

d. Natürliche Grösse. — *e*. Unterstück mit Fruchtzwei-
gen und Frühlingsfrüchten, 40mal vergrössert.

Tab. 80.

3044. *Gongroceras penicillatum*. (*Kg. l. c.* 678. — *Ceramium penicillatum Aresch.*) — Ad oras Sueciae: Areschoug.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, *c.* Mittelstück, beide mit Vierlingsfrüchten, und 40mal vergrössert.

Anmerk g. Diese Art gehört jedenfalls zur Gattung *Trichoceras*. Die Häärchen, welche nach Arechong an den Zweigen befindlich sein sollen, habe ich an meinem Exemplare nicht bemerken können; entweder stellt dieses eine *forma nuda* dar, oder die Häärchen sind, durch das wiederholte Ablösen des Exemplars vom Papier, verloren gegangen.

3045. *Gongroceras ungulatum*. (*Kg. l. c. 678.*) — Cap Horn.

Fig. *d.* Natürliche Grösse — *e.* Gipfelstück, — *f.* Basisstück, beide 40mal vergrössert.

Tab. 81.

3046. *Gongroceras ramulosum*. (*Kg. l. c. 678.*) — Van Diemens Land.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Mittelstück mit Kapselfrucht; *c.* Zweig mit Kapselfrucht; *d.* Basisstück mit Vierlingsfrüchten an den Seitenzweigen. *b.*—*d.* 40mal vergrössert.

3047. *Gongroceras corniculatum*. (*Mont. in litt. 1860.*) *G. capillare unciale ramosissimum*, ramis plus minusve obsessis ramulis fructiferis siliquaeformibus incurvis, tetrachocarpia numerosa dense aggregata ferentibus; articulis inferioribus diametro 4plo longioribus, zonis utrinque definitis, haud elevatis, interstitiis pellucidis tenerrimis. — Martinique: Montagne!

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* 40mal vergrössert; — *g.* Zweig mit Vierlingsfrüchten, 100mal vergrössert.

Tab. 82.

3048. *Gongroceras tenuissimum*. (*Kg. l. c. 680.*) — In mari baltico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. *b.* Gipfelstück mit einigen sehr vereinzelt Vierlingsfrüchten, *c.* Basisstück, beide 40mal vergrössert.

3049. *Gongroceras tenuicorne*. (*Kg. l. c. 680.*) — In sinu Codano.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Basisstück mit Fruchtzweig u. 2 Kapselfrüchten, 40mal vergrössert.

Tab. 83.

3050. *Gongroceras macrogonium*. (*Kg. nov. sp.*)
G. major setaceum dichotomum rigidulum, zonis omnibus distantibus elevatis, utrinque definitis; articulis infimis diametro aequalibus, mediis et superioribus 3—4plo longioribus, supremo brevissimo conico recto. — Mare adriaticum.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. *b. c. d. e.* 40mal vergrössert.

3051. *Gongroceras microdendron*. (*Kg. nov. sp.*)
G. biunciale et ultra, setaceum, alterne ramosissimum, habitu fruticuloso, ramulis terminalibus lanceolatis, apicibus rectis, plerumque simplicibus, raro bifidis, articulis omnibus fere aequalibus, zonis omnibus distinctis non elevatis. — Ad oras gallicas boreales.

Fig. *f.* Natürliche Grösse. — *g.* Mittelstück mit Fruchtzweigen und Vierlingsfrüchten, 40mal vergrössert.

Tab. 84.

3052. *Trichoceras pallidum*. (*Kg. l. c. 680.*) — Anglia.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c. d.* 40mal vergrössert

3053. *Trichoceras villosum*. (*Kg. l. c. 680.*) — In mari adriatico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. *f.* Gipfelstück mit Vierlingsfrüchten, *g.* Basisstück, 40mal vergrössert.

Tab. 85.

3054. *Trichoceras tasmanicum*. (*Kg. l. c.*) — Van Diemens Land: J. D. Hooker.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. *b. c.* Basis und Gipfelstück mit Kapsel Frucht, 40mal vergrössert.

3055. *Trichoceras pubescens*. (*Kg. in litt.*) *Tr. minus*, vage dichotomum, cespitosum, apicibus forcipatis clausis, articulis omnibus diametro aequalibus, zonis distinctis haud elevatis. — Madeira.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* 40mal vergrössert.

Tab. 86.

3056. *Echinoceras ciliatum*. (*Kg. l. c. 680.*) — In mari mediterraneo.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, *c.* Basisstück, beide 40mal vergrössert.

3057. *Echinoceras hirsutum*. (*Kg. l. c. 687.*) — In mari mediterraneo.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* 40mal vergrössert.

Tab. 87.

3058. *Echinoceras armatum*. (*Kg. Spec. Alg. 681.*) — Torbay: Berkeley.

Fig. *a.* Natürliche Grösse, — *b.* Basisstück, *c.* Gipfelstück, beide 40mal vergrössert.

3059. *Echinoceras imbricatum*. (*Kg. l. c. 687.*) — In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Gipfelstück, *f.* Basisstück, beide 40mal vergrössert

Tab. 88.

3060. *Echinoceras julaceum*. (*Kg. l. c. 681.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, *c.* Basisstück; beide 40mal vergrössert.

3061. *Echinoceras julaceum* β . *villosum*, *zonis aculeatis piliferis, superioribus villosis*. — In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Gipfelstück, *f.* Basisstück, beide 40mal vergrössert.

Tab. 89.

3062. *Echinoceras diaphanum* (*Kg. l. c. 681* — *E. hamulatum Kg. l. c. Nr. 10.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Basisstück, *c.* Gipfelstück, beide 40mal vergrössert

3063. *Echinoceras Hystrix*. (*Kg. l. c. 681.*) — In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Basisstück, *f.* Gipfelstück, beide 40mal vergrössert.

Tab. 90.

3064. *Echinoceras horridum*. (*Kg. l. c. 681. No. 7. β .*) — In mari mediterraneo.

Fig. *a. b.* Natürliche Grösse. — *c. d.* 40mal vergrössert.

3065. *Echinoceras tenellum*. (*Kg. l. c. 681. No. 7. γ .*) — Terracina.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f. g.* 40mal vergrössert.

Tab. 91.

3066. *Echinoceras spinulosum* (*Kg. l. c. 681.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse — *b. c.* 40mal vergrössert. — *d.* Ein Stachel 100mal vergrössert.

3067. *Echinoceras distans*. (*Kg. nov. sp.*) — *E. capillare elongatum gracile, dichotomum, apicibus hamatis, cystocarpiis involucratis, involucro polyphylo, phyllis elongatis gracilibus hamatis erectis; articulis inferioribus diametro 4plo longioribus, superioribus 2plo longioribus, zonis omnibus distantibus, aculeis elongatis 5 articulatis.* — Marseille: Giraudy. (Color pallidus.)

Tab. 92.

3068. *Echinoceras secundatum*. (*Kg. Spec. Alg. 682.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c. d.* 40mal vergrössert.

3069. *Echinoceras patens*. (*E. secundatum* β . *Kg. l. c. 682.*) — In mari adriatico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f. g.* 40mal vergrössert.

Tab. 93.

3070. *Echinoceras pellucidum*. (*Kg. l. c. 682.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c.* 40mal vergrössert.

3071. *Echinoceras puberulum*. (*Kg. l. c. 682.*) — In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e. f.* 40mal vergrössert.

Tab. 94.

3072. *Echinoceras ramulosum*. (*Meneghini.* — (*Kg. l. c. 683.*) — In mari adriatico.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c.* 40mal vergrössert.

3073. *Echinoceras nudiusculum*. (*Kg. l. c. 682.*) — In mari adriatico.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e. f.* 40mal vergrössert.

Tab. 95.

3074. *Celeceras monile*. (*Kg. Spec. Alg.* 684.) — Van Diemens Land: J. D. Hooker.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Gipfelstück mit Vierlingsfrüchten. *c*. Basisstück. Beide 40mal vergrössert. — *d*. Vierlingsfrüchte in dem kugelrunden Fruchtkörper, 100mal vergrössert.

Tab. 96.

3075. *Acanthoceras Shuttleworthianum*, (*brevi-articulatum*). (*Kg. l. c.* 684.) — Ireland.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Gipfelstück, *c*. Basisstück, beide 40mal vergrössert.

3076. *Acanthoceras Shuttleworthianum* β . *longiarticulatum*. — Ad oras Angliae.

Fig. *d*. Gipfelstück mit Vierlingsfrüchten. — *e*. Basisstück mit eigenthümlichen wurzelartigen, an der Spitze verdickten Auswüchsen. **** — *f*. Mittelstück mit ähnlichen Auswüchsen. Sämmtlich 100mal vergrössert.

Tab. 97.

3077. *Acanthoceras echionotum*. (*Kg. Spec. Alg.* 684.) — In mari germanico.

Fig. *a*. Natürliche Grösse. — *b*. Basisstück. *c*. Mittelstück mit Fruchtaest und Vierlingsfrüchten. *d*. Kapselfrucht mit dem Involucrum. *b* - *d*. 100mal vergrössert

3078. *Acanthoceras transcurrens*. (*Kg. l. c.* 684.) — Ad litora Calvadosii: Lenormand.

Fig. *e*. Natürliche Grösse. — *f*. Basisstück, *g*. Mittelstück mit Fruchtweig und Vierlingsfrüchten, beide 100mal vergrössert.

Anmerk. *Acanthoceras oxyacanthum* *Kg. l. c.* ist von *A. transcurrens* nicht wesentlich verschieden.

Tab. 98.

3079. *Acanthoceras distans*. (*Kg. nov. sp.*) *A. capillare unciale vel ultra, inaequaliter dichotomum, ramosissi-*

mum; apicibus forcipatis hamatis; articulis inferioribus diametro 3—4 plo longioribus, superioribus sesquolongioribus vel subaequalibus; zonis omnibus distantibus distinctis, haud elevatis, spinulis sparsis minoribus. — Cherbourg: Lenormand.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b. c.* 100mal vergrössert.

3080. *Acanthoceras azoricum*. (*Meneghini*. — *Kg. Spec. Alg.* 685.) — Azoren.

Fig. *d.* Natürliche Grösse. — *e.* Basisstück, *f.* Gipfelstück, beide 100mal vergrössert.

Tab. 99.

3081. *Hormoceras lobatum*. (*Kg. nov. sp.*) *H. digitale* — *spithamaeum*, *setaceum*, *rigidulum*, apicibus circinatis, inaequaliter forcipatis; articulis inferioribus diametro sesquolongioribus, superioribus aequalibus vel parum brevioribus; zonis decurrentibus, superioribus contiguis, inferioribus distantibus; margine superiori lobato; tetrachocarpiis verticillatis. — Ad oras Britanniae.

Fig. *a.* Natürliche Grösse. — *b.* Gipfelstück, *c.* Theil eines fruchtragenden Seitenzweigs mit Vierlingsfrüchten, *d.* Mittelstück mit Vierlingsfrüchten. — *b—d.* 40mal vergrössert.

3082. *Trichoceras transcurrens*. (*Hormoceras transfugum Kg. Spec. Alg.* 676.) — In mari adriatico.

Fig. *e.* Natürliche Grösse. — *f.* Gipfelstück, *g.* Mittelstück, *h.* Basisstück, — sämmtlich 40mal vergrössert.

Tab. 100.

3083. *Hormoceras polygonum*. (*Kg. Tab. ph. XII. p. 21.*) — Venetiis.

Fig. *a.* Gipfelstück mit Kapsel und Hülle (*), *b.* Theil der Kapsel mit den Sporen zerdrückt, beide 100mal vergrössert.

3084. *Gongroceras nodiferum*. (*Kg. Spec. Alg.* 678. — *Tab. phyc. XII. p. 24.*) — In mari adriatico.

Fig. *c.* Kapseltragendes Exemplar in natürlicher Grösse, — *d.* Basisstück, — *e. f.* Gipfel- und Mittelstücke mit Kapseln — sämmtlich 100mal vergrössert.

TABULAE PHYCOLOGICAE.

TABULAE PHYCOLOGICAE

Callithamnion



venustissimum

XII

micropterum

Fig 14/4 1891

Callithamnion



nanum


XII



gorgoneum

1874. 1881.

Callithamnion



tetragonum

brachiatum Fig. 174. 11

Phlebothamnion



stuposum

hirtum

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Phlebothamnion



Montagniei

XII

Gaudichaudii

Fig. 2740

Phlebothamnion



Giraudyi

XII

scoparium

Fig. 21/4 1861

Phlebothamnion



Arbuscula

purpuriferum

Fig. 24. 25.

Phlebothamnion



latissimum



byssoides

Fig. 2940

Phlebothamnion



corymbiferum

corymbosum

Ag. 1840.

XII

Callithamn. corymbosum Kt.

Phlebothamnion



versicolor

= *Callithamn. corymbosum* Kt. ^{VII}



lanceolatum

Ag. 27. 1841

= *Callithamn. sciroperman* Griff
α. *lanceolatum*

Phlebothamnion



spinescens

granulatum

Fig. 204


XII

= *Callithamn. granulatum* Ag.

Phlebothamnion



Phlebothamnion



grande


spongiosum

Ag. 2/10. 1100

XII

= Callithamn. granulatum Ag.

Phlebothamnion




pachycaulon

velutinum

Ag. sp. no.

Phlebotamnion

Callithamnion



(40:4)



d

e




(40:4)

seguarresum

pinnatifurcatum Ag. ex Arn.
= *C. byssoides* Arn.

Stephanocomium

Leptothamnion




adriaticum



Rabenhorstii

Scirospora



Griffithsiana

*Callithamnium
seirosporum* Griff.


XII

Glaccida

Fig. 17. 18.

Callith. seirosporum Griff.
β. graniferum

Scirospora.



humilis


Griffithsia



argus

Fig. 1. 2.

Griffithsia



grandis



tasmanica

Ag. 910

Griffithsia



(423)


(1002)

Corallina

setacea

Fig. 13/14

Griffithsia



crinita

chilensis

Ag. n. sp.

Griffithsia



(40:1)



secundiflora

XII




cymiflora

Fig. 22/3 a.




Griffithsia



antarctica

(40:1)



subverticillata

Fig. 24





Griffithsia



Pinderiana

irregularis — Fig. 29000

Griffithsia




sphaerica

devoniensis

Fig. 120

Griffithsia



(40:1)



(400:1)

opunticoides

Schousboei

T. 22/10

Griffithsia




neapolitana

dalmatica

Ag. 20, 21

Griffithsia



phyllamphora

XII

ligustica

Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Griffithsia



(40:1)



globulifera

furcellata

Fig. 40. 1.

Griffithsia



ramullosa




tenuis

Fig. 14. 15.

(40:1)

Griffithsia



arachneidea


Duriaei

2/3 100

Griffithsia




Biederiana



irregularis — Fig. 20000

Griffithsia



a



b



c



d



e

(46:1)



h



g



f



i

(10:1)

sphaerica

devoniensis

Fig. 272 a

Griffithsia



(40:1)

(400:1)

opunticoides

XII

Schousboei

Lynn

Griffithsia



a



d




b



c

(40:1)




e

neapolitana

dalmatica

Ag. 20. 11.

Griffithsia




phyllamphora

XII

ligustica

Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Griffithsia



globulifera

XII


furcellata

Fig. 1. 2. 3.

Griffithsia



ramullosa




tenuis

Fig. 1801

(40:1)

Griffithsia




arachnoida

Duriaci

1/2 m.

Griffithsia




Flabur



Simplicifilum

XII

equisetifolius — Fig. 48. 110.



(4021)

Pachychaeta griffithsioides Fig. 4021


Halodictyon*mirabile**Planowia**australis*

Fig. 178. 18

Ballia



Callitricha
XII

Fig. 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37 1/38 1/39 1/40 1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 1/63 1/64 1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81 1/82 1/83 1/84 1/85 1/86 1/87 1/88 1/89 1/90 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/100

Ballia



Hombrenii

Picuri

Ag. ap. 100.

*Warrenia comosa**Wrangelia verticillata*



Wrangelia



cymosa



dasyclada

Wrangelia




cymosa



dasyclada



Spyridia



filamentosa

tasmanica

Fig. 456

Spyridia*a**c**b*

(100:1)





*d**crassa**occidentalis*

Fig. 20/10

Spyridia




Setacea

nudiusecula

Fig. 210

Spyridia




Montagneana

XII

clavata

Fig. 23/10

Spyridia



fruticulosa

villosa

Fig. 2490 1861

Spiridia




divaricata

arcuata

Fig. 278. 1801


Spyridia



a



c



b


d



cuspidata

villosiuscula Ag. spec.

Spyridia




hirsuta

apiculata

Fig. 116, 117

Spyridia



Berkelaji

armata

Fig. 215 a

Spyridia



(100:1)



aculeatae

spinellae

Fig. 4/5 ca

Spyridia




(100:4)




ericoides

tetraacantha Fig. 4/c




Pindera cupressina XII. Fig. 4/5 110.

Ptilota*plumosa**B. pectinata*

XII

Fig. 178. 11.

Phylota plumosa



formosa

serrata

Fig. 11.

Phylota



(100:1)



elegans


articulata

Fig. 97. 11




Rhodocallis



elegans




setigera



Rhodocallis asplenoides

Fig. 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100



Euptilota



formosissima

Harveyi

Ag. n. sp. an.



Euplilota Pappiana





*Carpoblepharis
pinnatifolia*

Ag. ex. m.



Carpolepharis flaccida

Haloplegma

(100x)


*Duperreiji**Preissii**Fig. 100x*

Haloplegma

(m:4)

*Cornu Damac**africanum*

Fig. 14/15. 16/17.

*Dictyurus occidentalis*




XII

*Thuretia quercifolia*

*Dasyphila**Ptilocladia**Freissii**pulchra*

Fig. 2074. 1861

Hormoceras




polyceras

XII

proliferum

21/7 11

Hormoceras




nodosum

polygonum

Fig. 100

Hormoceras



diaphanum

XII

gracillimum

Fig. 171. 171. 171.

Hormoceras




flaccidum

XII

moniliforme

Fig. 247.

Hormoceras



circinatum

catenula

Fig. 192. 100


Hormoceras



a



d




b



c



e



f

g




decurrens

cateniforme

Fig. 207. 40.

Hormoceras




duriusculum

confluens

Fig. 278. 1850.


Hormoceras



perversum

fruticulosum — *Fig. 216. 1801*

Hormoceras



(401)

Biasolettianum

variegatum

Fig. 29/4 1101

Hormoceras

a



(40:4)




pygmaeum

XII

pulchellum

Fig. 6/1. 100.

Hormoceras



(40:4)



siliquosum

XII

syntrophum

Fig. 24 & 25

Gongroceras



Deulongchampii

Agardhianum Fig. 1150

Gongroceras



pellucidum

strictum

Fig. 23. 1861


Gongroceras



a




d



b

c

(402)




e

fastigiatum

nodiferum

Fig. 43. 200

Gongroceras




penicillatum

XII

ungulatum

Fig. 17. 18.

Hormoceras




Biaselettianum

variegatum


Fig. 29/4 1101

Hormoceras

a



(40.29)




pigmacum

XII

pulchellum

Fig. 2/1-III

Hormoceras




siliquosum

syntrophum

Fig. 145 m

Gongroceras



(Fig. 1)

Deslongchampsii

Agardhianum Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Gongroceras




pellucidum

strictum

Fig. 23. 1861

Gongrocerus




fastigiatum

XII

nodiferum

Fig. 43. 44.


Gongroceras



penicillatum

ungiculatum



Gongroceras



ramulosum

corniculatum — Fig. 1710


Gongroceras




Aenuissimum

Aenuicorne

Gongroceras



macrogenium



microdendron

Ag. sp. m.




Trichoceras*pallidum**villosum*

Fig. 1211

Trichoceras






lasmanicum

XII

pubescens

Fig. 4th. 1800.

Echinoceras

(4:1)

*ciliatum**hirsutum*

Fig. 10/11

Echinoceras




armatum

imbricatum

Fig. 191. 192.



1875



THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY

Echinoceras





julaceum

XII

β villosum

Fig. 172. m

Echinoceras




diaphanum

Hystrix

Fig. 40. 100.

Echinoceras



(40:4)

horridum

tenellum

Fig. 40. 1811

Echinoceras



spinulosum

XII


distans

Fig. 1. 2. 3.

Echinoceras



secundatum



patens

Fig. 123. 124.

Kützing, Frdr. Traug.

Tabulae phycologicae oder Abbildungen der Tange

Bd.: XII

Nordhausen 1862

Phyt. 319 hb-12

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302113-0